

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO NORTE TRANSMONTANO


CASTANHEIRO

ATENÇÃO!

Vespa das galhas do castanheiro

A luta biológica, é o único meio capaz de combater esta importante praga, com o recurso a outro insecto, o parasitóide *torymus sinensis*.

Nos locais onde se fizeram largadas deste insecto, e na sua proximidade, os tratamentos químicos são proibidos.



Torymus sinensis (fêmea)

Para além de serem totalmente ineficazes, matariam o insecto auxiliar.

Nestes soutos, não devemos também retirar as galhas, **verdes ou secas**, pois estaríamos a eliminar o parasitóide e por em causa a sua instalação.

BATATEIRA

Míldio

Estas condições climáticas e as previsões do estado do tempo para a região são também favoráveis ao aparecimento de infecções de míldio nesta cultura, pelo que, deve continuar a proteger o seu batatal, com um...

VINHA

Oídio

A vinha encontra-se numa fase de desenvolvimento particularmente sensível ao oídio, e o tempo tem decorrido favorável ao seu desenvolvimento.

Aconselhamos, por isso, a manter a vinha protegida contra esta doença até ao **Fecho do Cacho**, utilizando um produto penetrante indicado na lista anexa.

Se, em alternativa, e o estado do tempo o permitir utilizar enxofre em pó, procure não fazer este tratamento com temperaturas elevadas – acima dos 32°C - e a planta molhada, para evitar riscos de fitotoxicidade – (queima).



Oídio na folha e no cacho

Míldio

A instabilidade do tempo verificada nos últimos dias tem provocado novos focos de infecção da doença. Aconselhamos a fazer um tratamento com um produto penetrante com capacidade curativa (consultar lista anexa)

